

INDICATIONS : Recommandé pour la vaccination des chiens, des chats et des furets en santé âgés d'au moins 12 semaines contre la maladie attribuable au virus de la rage.
POSOLOGIE : Par technique aseptique, administrer 1 mL (1 dose) en injection sous-cutanée ou intramusculaire aux chiens et aux chats en santé. Revacciner un an plus tard, puis tous les trois ans. Administrer 1 mL (1 dose) en injection sous-cutanée aux furets. Revacciner annuellement les furets.

VOIR LE MODE D'EMPLOI COMPLET AU VERSO.

Contains 50 Doses

50 x 1 Dose (1 mL)

Contient 50 doses

50 x 1 dose (1 mL)


Rabies Vaccine

Killed Virus

Vaccin antirabique

Virus tué

Rabies 3 Year TF / Rage 3 ans TF



Imrab® 3 TF

Store at 2–7°C (35–45°F).

Do not freeze. For Veterinary Use Only.

IMRAB is a registered trademark of MERIAL.

Entreposer entre 2 et 7 °C (35 et 45 °F).

Ne pas congeler. Pour usage vétérinaire seulement.

IMRAB est une marque déposée de MERIAL.

50 doses

Manufactured By / Fabriqué par
MERIAL, INC.

Athens, GA 30601 USA / É.-U.

U.S. Vet. Lic. No. 298 /

Perm. vét. des É.-U. n° 298

1-888-Merial-1 (1-888-637-4251)

Distributed In Canada By /

Distribué au Canada par

MERIAL CANADA, INC.

Baie d'Urfé, Qc, H9X 3V1

Prod. No. / N° prod. 2311-50



INDICATIONS: Recommended for the vaccination of healthy cats, dogs, and ferrets 12 weeks of age and older for prevention of disease due to rabies virus.

DOSAGE: Aseptically inject 1 mL (1 dose) subcutaneously or intramuscularly into healthy cats or dogs. Revaccinate 1 year later, then every 3 years. Inject 1 mL (1 dose) subcutaneously in healthy ferrets. Revaccinate ferrets annually.

SEE REVERSE SIDE FOR COMPLETE DIRECTIONS.

DESCRIPTION: IMRAB® 3 TF contains the same virus strain that is used in the Pasteur Merieux Connaught human vaccine. The virus is grown in a stable cell line, inactivated, and mixed with a safe and potent adjuvant. Safety and immunogenicity of this product have been demonstrated by vaccination and challenge tests in susceptible animals.

INDICATIONS: IMRAB® 3 TF is recommended for the vaccination of healthy cats, dogs, and ferrets 12 weeks of age and older for prevention of disease due to rabies virus.

DOSAGE: Aseptically inject 1 mL (1 dose) subcutaneously or intramuscularly into healthy cats or dogs. Revaccinate 1 year later, then every 3 years. Inject 1 mL (1 dose) subcutaneously in healthy ferrets. Revaccinate ferrets annually.

PRECAUTIONS: Store at 2-7°C (35-45°F). Do not freeze. Shake well before using. Do not use chemicals to sterilize syringes and needles. Contains gentamicin as a preservative. This product does not contain thimerosal. A transient local reaction may occur at the injection site following subcutaneous administration. Some reports suggest that in cats, the administration of certain veterinary biologicals may induce the development of injection site fibrosarcomas. In rare instances, administration of vaccines may cause lethargy, fever, and inflammatory or hypersensitivity types of reactions. Treatment may include antihistamines, anti-inflammatories, and/or epinephrine.

SOLD TO VETERINARIANS ONLY.

RM960R1

DESCRIPTION : IMRAB® 3 TF renferme la même souche virale que celle utilisée dans le vaccin pour les humains de Pasteur Merieux Connaught. Le virus est propagé dans une lignée cellulaire stable, inactivé et mélangé avec un adjuvant sûr et efficace. L'innocuité et l'immunogénicité de ce vaccin ont été démontrées par la vaccination d'animaux susceptibles et par leur exposition au virus lors d'épreuves de provocation.

INDICATIONS : IMRAB® 3 TF est recommandé pour la vaccination des chats, des chiens et des furets en santé âgés d'au moins 12 semaines contre la maladie attribuable au virus de la rage.

POSOLOGIE : Par technique aseptique, administrer 1 mL (1 dose) en injection sous-cutanée ou intramusculaire aux chiens et aux chats en santé. Revacciner un an plus tard, puis tous les trois ans. Administrer 1 mL (1 dose) en injection sous-cutanée aux furets en santé. Revacciner annuellement les furets.

MISES EN GARDE : Entreposer entre 2 et 7 °C (35 et 45 °F). Préserver du gel. Bien mélanger avant l'utilisation. N'utiliser aucun produit chimique pour stériliser les seringues et les aiguilles. Renferme de la gentamycine comme agent de conservation. Ce produit ne renferme pas de thimérosal. Une réaction locale transitoire peut être observée au point d'injection, à la suite d'une administration sous-cutanée. Quelques rapports indiquent que chez le chat, l'administration de certains vaccins peut provoquer la formation de fibrosarcomes au point d'injection. Dans de rares cas, la vaccination peut causer de la léthargie, de la fièvre et des réactions inflammatoires ou d'hypersensibilité. Traiter avec des antihistaminiques, des anti-inflammatoires ou de l'épinéphrine.

LA VENTE DE CE PRODUIT EST RESTREINTE AUX VÉTÉRINAIRES.